



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.
 Fax: 2510 600430
 E mail dpyrgiotou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 26/15-07-2020

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Διαμαντάκος, Θ. Γεωργιάδου.

ΑΜΠΕΛΙ

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)



Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων, η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές με ικανό αριθμό συλλήψεων ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την δραστηριότητα του εντόμου. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπ' όψη και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αμπέλι (κατά το οποίο μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου. Σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε με τα προηγούμενα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε η υπηρεσία μας, συνιστάται να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός μία εβδομάδα μετά τον τελευταίο ψεκασμό ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κάθε αμπελώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τονίζεται, μεταξύ των άλλων και το ενδεχόμενο αξιοποίησης και σκευασμάτων με βάση τον Βάκιλλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*), ο οποίος δεν αφήνει υπολείμματα δραστικών ουσιών στα παραγόμενα σταφύλια.

Τονίζεται και πάλι ότι οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι και να επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης. Όταν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναμένονται βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής συχνά εκπλύνονται από την βροχή.

Σκόπιμη είναι η από κοινού καταπολέμηση του ωιδίου (*Erisiphe necator*) ενώ όσον αφορά τους υπόλοιπους εχθρούς και ασθένειες (τζιτζικάκι – *Empoasca* spp, Ψευδόκοκκος - *Plasmodium citri*, περονόσπορος - *Plasmopara viticola*, βοτρυτής – *Botrytis cinerea*), οι οποίοι μπορεί να προσβάλλουν το αμπέλι κατά την παρούσα περίοδο ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες τις οποίες παραθέσαμε με προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Υπενθυμίζεται η ανάγκη

πραγματοποίησης ψεκασμού κατά του Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) σε μεταγενέστερο χρόνο λίγο πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού.

Σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
- Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Σας ενημερώνουμε ότι οι δραστικές ουσίες *chlorpyrifos* & *chlorpyrifos methyl* δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φ.π. σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις φ.π. που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη είναι 16 Απριλίου 2020. Επίσης λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των ανωτέρω δραστικών ουσιών, ψηφίστηκε κανονισμός μείωσης όλων των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων των *chlorpyrifos* & *chlorpyrifos methyl* στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα όρια θα ισχύσουν από το φθινόπωρο του 2020.



Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, idiamantakos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr,

Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου